

## Instrucciones Estabilizador de Dentaduras



(1.) Remover la dentadura inferior del paciente. Dejar la dentadura superior en la boca del paciente. Unir agarradera plástica y estabilizadores a la barra cruzada. Colocar el disclusor más grande. Colocar los estabilizadores entre 15 y 17.5 cms (dependiendo del ancho de la cara) a una distancia igual de la línea media de la barra cruzada.



(2.) Asegurarse que la dentadura inferior del paciente se ajustará fácilmente dentro de la agarradera; si no, modificar la agarradera.





(3.) Unir la dentadura inferior a la agarradera con yeso de fraguado rápido. Deslizar las dos bandas elásticas en el estabilizador únicamente en un lado del paciente, dejando los extremos sueltos libres. Humedecer la dentadura y esparcir polvo para dentadura.



(4.) Colocar la dentadura inferior con la barra cruzada en la boca del paciente y hacer que el paciente muerda dos rollos de algodón (colocados en forma bilateral). Mientras el paciente muerde firmemente los rollos, estirar los elásticos del estabilizador de un lado, debajo de la mandíbula y unirlos al estabilizador en el otro lado del paciente (una banda cercana al mentón y la otra cerca del cuello). Remover la dentadura maxilar y permitir que el discluser de la agarradera se deslice contra la encía desdentada anterior.



(5.) Colocar el bastidor maxilar para localizar el eje y registrar el eje mandibular de la forma usual, después tomar el registro protrusivo y de movimiento lateral Bennett. Remover el bastidor de la cabeza y marcar el eje mandibular en la piel. Reemplazar con la dentadura superior y hacer que el paciente muerda dos rollos de algodón. Mientras el paciente muerde los rollos, soltar los elásticos, primero en un lado del paciente y después remover el ensamblado dentadura inferior, agarradera y barra cruzada.